

DIFLANIL 500 SC

Herbicīds

Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu un speltas kviešu sējumos.

Darbīgā viela: Diflufenikans 500 g/l

Preparatīvā forma: Suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 12 x 1 L, 4 x 5 L, 2x10 L

Reģistrācijas klase: 2


Reģistrācijas numurs: 0530

Partijas numurs: Skatīt uz iepakojuma.

Izgatavošanas datums: Skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: 2 gadi kopš izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Uzglabāšana: Sausā, vēsā vietā, prom no karstuma avotiem un tiešiem saules stariem, hermētiski noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

 <p>Uzmanību</p>	<p>H410 – Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH401: Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. P391 - Savākt izšļakstīto šķidrumu. P501 - Atbrīvojoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.</p> <p>Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.</p>
--	---

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:

Globachem n.v.
Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019
3800 Sint-Truiden, Belgium

Izplatītājs:

SIA „Scandagra Latvia”

Rīga, Vienības gatve 87H, LV–1004, Latvija

Tālr.: (+371) 63407196, fakss: (+371) 63407197

E-pasts: info@scandagra.lv

SIA “LINAS AGRO”

„Baltijas Ceļš”, Cenu pagasts,

Ozolnieku novads, LV 3043

Tālr.: +371 630 840 24

Fakss: +371 630 842 24

LPKS LATRAPS

Lietuvas iela 16 A

Eleja, Elejas pagasts

Jelgavas novads, LV-3023, Latvija

Tālr.: +371 6302 5898

DIFLANIL 500 SC

Herbicīds

Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu un speltas kviešu sējumos.

Darbīgā viela: Diflufenikans 500 g/l

Preparatīvā forma: Suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 1 L, 5 L, 10 l, 20 L

Reģistrācijas klase: 2

Reģistrācijas numurs: 0530

Partijas numurs: Skatīt uz iepakojuma.

Izgatavošanas datums: Skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: 2 gadi kopš izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Uzglabāšana: Sausā, vēsā vietā, prom no karstuma avotiem un tiešiem saules stariem, hermētiski noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.



Uzmanību

H410 – Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401: Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P391 - Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501 - Atbrīvojies no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:

Globachem n.v.
Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019
3800 Sint-Truiden, Belgium

Izplatītājs:**SIA „Scandagra Latvia”**

Rīga, Vienības gatve 87H, LV-1004, Latvija

Tālr.: (+371) 63407196, fakss: (+371) 63407197

E-pasts: info@scandagra.lv

SIA “LINAS AGRO”

„Baltijas Ceļš”, Cenu pagasts,

Ozolnieku novads, LV 3043

Tālr.: +371 630 840 24

Fakss: +371 630 842 24

LPKS LATRAPŠ

Lietuvas iela 16 A

Eleja, Elejas pagasts

Jelgavas novads, LV-3023, Latvija

Tālr.: +371 6302 5898

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, iedzeriet 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus gumijas cimdus un slēgtus apavus.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt / nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Diflanil 500 SC ir selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu un speltas kviešu sējumos. Smidzinot Diflanil 500 SC uz sadīgušām nezālēm, tas tiek uzņemts caur nezāļu lapām. Herbicīda iedarbība uz nezālēm parādās pēc 2-5 dienām kā gaiši plankumi vai bālēšana. Pēc preparāta izsmidzināšanas uz augsnes

virskārtas izveidojas plēvīte. Nezālēm dīgstot, tās caur saknēm un dīgstiem uzņem līdzekli. Pret diflufenikānu jutīgās nezāles var dīgt, taču uzreiz pēc dīgšanas tām novēro hlorozi un pēc laika tās iznīkst. Dažos gadījumos pie vēlākas apstrādes kultūraugiem var parādīties pārejoši balti plankumi, kas vēlākā veģetācijas periodā izzūd. Ziemāju labībām labākos rezultātus dod līdzekļa lietošana rudenī, kad nezāles ir agrās attīstības stadijās un tās ir aktīvi augošas un tām ir mazāk par sešām lapām.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, speltas kvieši

Diflanil 500 SC var lietot pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar vienu lapu līdz cerošanas beigām (AS 11-29). Apstrādi var veikt rudenī vai pavasarī. Mazāko devu var lietot dīgstošām nezālēm labvēlīgos attīstības apstākļos.

Deva: 0,125-0,250 l/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits veģetācijas periodā: viena reize.

Diflanil 500 SC efektivitāte ar devu 0,125 l/ha:

Laba iedarbība (efektivitāte >90%):

Ganu plikstiņš (*Capsella bursa-pastoris*).

Vidēja iedarbība (efektivitāte 70- 89.9%)

Parastā virza (*Stelaria media*), sārtā panātre (*Lamium purpureum*), persijas veronika (*Veronica persica*), tīruma atraitnīte (*Viola arvensis*), efejlapu veronika (*Veronica hederifolia*), lauka skrēteliņš (*Aphanes arvensis*), pērkone tīruma (*Raphanus raphanistrum*).

Vāja iedarbība (efektivitāte <69.9%):

Ķaraiņu madara (*Galim aparine*), tīruma kumelīte (*Matricaria inodora*), ārstniecības kumelīte (*Matricaria recutita*).

Diflanil 500 SC efektivitāte ar devu 0,25 l/ha:

Laba iedarbība (efektivitāte >90%):

Ganu plikstiņš (*Capsella bursa-pastoris*), parastā virza (*Stelaria media*), sārtā panātre (*Lamium purpureum*), lauka skrēteliņš (*Aphanes arvensis*).

Vidēja iedarbība (efektivitāte 70- 89.9%)

Persijas veronika (*Veronica persica*), tīruma atraitnīte (*Viola arvensis*), efejlapu veronika (*Veronica hederifolia*), pērkone tīruma (*Raphanus raphanistrum*), tīruma kumelīte (*Matricaria inodora*).

Vāja iedarbība (efektivitāte <69.9%):

Ķaraiņu madara (*Galim aparine*), ārstniecības kumelīte (*Matricaria recutita*), maura sūrene (*Polygonum aviculare*).

Augsnes sagatavošana: Lai preparāta efektivitāte būtu laba, augsnes virskārtai jābūt sīkdrupatīnai, bez cilām. Salmu un citu augu atliekas uz augsnes var samazināt preparāta efektivitāti. Sēklām jābūt iesētām 3 cm dziļumā. Labāks rezultāts sagaidāms, ja augsnes virskārta ir mitra. Sausuma periods var samazināt preparāta efektivitāti. Ja augsnē organiskās vielas saturs pārsniedz 10%, tad preparāta iedarbība nav ilglaicīga.

Ūdens tilpums: Darba šķidrums daudzums: 200-400 l/ha.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS RISKĀ IEROBEŽOŠANA

Diflanil 500 SC satur darbīgo vielu diflufenikans, kas atbilstoši HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) pieder grupai F1.

Lai samazinātu rezistences veidošanos, jāievēro sekojoši noteikumi:

1. Vienā un tajā pašā laukā dažādos gados lietot dažāda iedarbības veida herbicīdus. Lietot reģistrēto herbicīda devu un apstrādi veikt pareizā laikā.
2. Pēc apstrādes apsekot laukus un informēt preparāta ražotāju par samazināto efektivitāti nezāļu ierobežošanā.

PĒCKULTŪRAS UN PĀRSĒŠANA

Ja laukā, kur rudenī veikta apstrāde ar DIFLANIL 500 SC, pavasarī nepieciešama augu pārsēšana, pēc lauka uzecēšanas var sēt vasaras miežus vai vasaras kviešus. Pirms kartupeļu stādīšanas nepieciešama atkārtota lauka aršana. Vasaras eļļas augus, zirņus, pupas, sīpolaugus, āboliņu un bietes sēt nedrīkst.

Pirms ziemas rapša sējas lauku, kurā pavasarī tika lietots Diflanil 500 SC, nepieciešams uzart.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms lietošanas konteineru labi sakratīt. Smidzinātāju līdz pusei piepildīt ar tīru ūdeni, pēc tam pievienot nepieciešamo līdzekļa DIFLANIL 500 SC daudzumu. Gadījumā, ja smidzinātājs ir bez automātiskā maisītāja, šķidrumu tvertnē samaisīt mehāniski un uzpildīt līdz nepieciešamajam tilpumam.

APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Pēc darba, smidzināšanas iekārtu rūpīgi izmazgāt ar mazgāšanas līdzekli, jo pat neliels līdzekļa atlieku daudzums var izraisīt bojājumu citiem augiem.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc preparāta izmantošanas tukšā tara 3 reizes jāizskalo ar tīru ūdeni un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidruma gatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmatot atkārtoti. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Sausā, vēsā vietā, prom no karstuma avotiem un tiešiem saules stariem, hermētiski noslēgtā oriģinālā iepakojumā.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi kopš izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā

sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā.