



## Herbicīds

Vienkāršs un ērts risinājums plaša spektra divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, vasaras miežu sējumos.

**Savietojamība:** Ierobežojamo nezāļu spektra paplašināšanai lietot maisījumā ar Flurostar 180. Nelietot maisījumā ar citiem sulfonilurīnvielas produktiem.

**Bezlietus periods:** 2 stundas.

**Svarīgi:** lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.

**Darbīgās vielas:** metil-metsulfurons, 68 g/kg; metil-tifensulfurons, 682 g/kg

**Reģistrācijas numurs:** 0357

**Preparatīvā forma:** dispergējošas granulas

**Reģistrācijas īpašnieks:** Rotam Agrochemical Europe Limited.

**Iepakojums:** 120 g

**Ierobežojamās nezāles:** parastā virza, tīruma neaizmirstule, blusu sūrene, tīruma sinepe, rapsis sārņaugš, tīruma naudulis, dārza vējgriķis, sārtā panātre, baltā balanda, maura sūrene, tīruma kumelīte, zīda magone, ganu plikstiņš.

## Lietošanas laiks un devas:

- Ziemas kvieši: 0,015 kg/ha. Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz graudaugu pirmā mezgla stadijai (AS 31).
- Vasaras kvieši, vasaras mieži: 0,010 kg/ha. Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3 lapu stadiju līdz pirmā mezgla stadijai (AS 13–31).

Viena apstrāde sezonā.

## Lietošana:

- Augstākā efektivitāte sagaidāma, ja nezāles tiks ierobežotas to agrīnā attīstības stadijā - 2-4 īsto lapu stadijā.
- Nelietot kultūrauga stresa apstākļos, tādas kā salnas, temperatūrās virs +25°C.
- Var lietot visās kviešu šķirnēs, izņemot cietos kviešus.
- Nelietot graudaugos ar zālāju un āboliņa pasēju.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.



**Nordisk Alkali**

member of the Belchim Group

