

Širlans 500 s.k.

Fungicīds

Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 5l

- Pieskares iedarbības fungicīds kartupeļu lakstu puves ierobežošanai kartupeļu stādījumos.
- Laba bumbuļu aizsardzība.



Lietošanas norādījumi:

- Lietot profilaktiski, pirms slimības pazīmju parādīšanās.
- Ieteicamais apstrādes laiks AS 40-97.
- Maksimālais apstrāžu skaits sezonā - 8 reizes.
- Ieteicams lietot miglošanas programmās, kombinējot Širlans 500 s.k. ar kādu sistēmas iedarbības fungicīdu.

Intervāli starp apstrādēm:

Zema slimības riska pakāpe,
14 dienas starp apstrādēm.


Augsta slimības riska pakāpe,
10 dienas starp apstrādēm.

Sevišķi augsta slimības riska pakāpe,
7 dienas starp apstrādēm.

- Deva: 0,4 l/ha
- Darba šķidrums daudzums 200-500 l/ha. Izvēlieties atbilstošu darba šķidrums daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kartupeļu lapu un stublāju pārklāšanu.
- Nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai: 7 dienas.

Iedarbības mehānisms:

Preventīva
aizsardzība
(fluazinams)



Ieteikumi:

Stublāju un bumbuļu sekmīgai aizsardzībai, miglot 1 - 2 reizes sezonā ar devu 0,4 l/ha. Izmantot miglošanas shēmās kopā ar citiem fungicīdiem.

